



PŘIKRMOVÁNÍ ZVĚŘE V KRKONOŠSKÉM NÁRODNÍM PARKU

Zásadní otázkou péče o zvěř v národním parku je, zda přikrmovat či ne. Vlastní přikrmování v přírodních podmínkách je jistě sporné. Je nutné si však uvědomit, že zvěř byla člověkem postupně vytlačena mimo oblasti, kde bylo možné snadno sehnat potravu. V době obrovského turistického tlaku na prakticky celé území národního parku je nutno vylénit určitý omezený prostor, kde bude prováděno intenzivní zimní přikrmování zvěře.



Jelení zvěř u oborního plotu sleduje pozorně pohyb oborníka v době krmění. Krmění musí probíhat v pravidelnou denní dobu.



Krmná zařízení pro srstí zvěř jsou rozmístěna po celém území národního parku a jeho ochranného pásma. Byla vybudována v místech větší akumulace zvěře. Každodenní krmění v zimním období je samozřejmostí.

Přikrmování zvěře je prováděno na základě nových poznatků v oblasti výživy zvěře, které jsou postupně zaváděny do praxe. Preferovány jsou kvalitní senáže, seno, nejedlé slámy, popel, granulát. Je vhodné vyloučit jedlá krmiva v období od 20. prosince do konce února.

ZPŮSOBY PŘIKRMOVÁNÍ:
Hlavním cílem přikrmování je alespoň částečně kopírovat přirozenou nabídku potravy.

TRÍ ZÁKLADNÍ SKUPINY KRMIV:

- objemové krmivo – tj. seno a senáž; dostatek objemového krmiva je základem přikrmování po celou zimní sezónu
- jedlé krmivo – oves, žito, kukuřice, voštinové granuláty
- doplňkové krmivo – krmná řepa a kvedlíčka

Dále se zvěř předkládá doplňkové krmivo – letšina, sušené ječmeny, vitamínizované a minerální přísady.

SPECIÁLNÍ SLÁŽ – KOMBINACE VÍCE DRUHŮ KRMIV:

V současné době je na území národního parku, a zejména pak v oblasti Společného hřbitova, používána speciální sláž, která byla vyvinuta a úspěšně aplikována v oblasti Alpijských Alp.

Složení krmné směsi	pro jelení zvěř	pro srstí zvěř
Čerstvá kukuřičná řezanka	35 %	25 %
Ječmenová sláň	20 %	10 %
Luční seno kvalitní	15 %	10 %
Kořen mrkve	10 %	13 %
Ječmen	9 %	20 %
Jablečné řízky	11 %	12 %

Některé z komponentů může být do výše 5 % nahrazen pševárečným mlátem za současného přídatí minerálních nebo vitamínových přísad.



Přikrmovací obory – hlavní síť přikrmovacích zařízení pro jelení a srstí zvěř.



Mimo přikrmovací obory je nutno zvažovat přístup ke krmivům i srstí zvěř, která pak nemá snahu se u těchto zařízení v zimním období zdržovat a z velké většiny je umísťována v zaizolovaných krmných úsecích – přikrmovacích oborech.

